

Síntomas de intoxicación: Irritación nasal y ocular, tos, dolor de pecho, diarreas, vómitos, dolor abdominal, convulsiones.

Primeros auxilios

Si este producto es ingerido, no provoque vómitos y conduzca al afectado a un centro de urgencias de inmediato. Si este producto alcanza sus ojos, quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si el producto es inhalado, traslade al afectado al exterior. Si las molestias persisten, contacte inmediatamente a un médico mostrando la etiqueta u hoja de seguridad al médico.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Registro ISP Nº: P- 412/14

En caso de emergencias llame al:
CITUC: (56) 2 2635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540

Grupo Químico: Piretroide.

Condición de Venta: Venta especializada.

Clasificación toxicológica: Clase IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal.

Recomendaciones de dilución y uso:

Insecto a controlar	Lugar de aplicación	Dosis de Producto	Área a cubrir
Voladores: Moscas, zancudos, polillas, tábanos, avispas, etc.	interior	10 cc	20 m ² (1 L de agua)
	exterior	15 cc	
Rastreros: Baratas, garrapatas, arañas, hormigas, pulgas, termitas, etc.	interior	15 cc	20 m ² (1 L de agua)
	exterior	20 cc	

- Aplique mediante un atomizador, bomba manual o bomba motorizada, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra o chorree).
- Asperje todas las superficies en donde transiten o se posen los insectos que desea controlar.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- El tiempo de reingreso es de 2 horas, ventilando previamente las habitaciones.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes, gafas, máscara con filtro y overol (traje impermeable).
- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No mantener este producto al alcance de los niños, ni junto a alimentos, guardar bajo llave.
- No asperje este producto contra el viento, no inhalar.
- No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No coma, fume o beba cuando aplique este producto.
- Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón las áreas del cuerpo que han estado expuestas al producto.
- Elimine el envase en forma segura, no lo reutilice.
- Producto tóxico para peces.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CUIDADO



Insecticida - termiticida piretroide de rápido efecto y larga acción residual

Doctor Fly controla moscas, garrapatas, termitas, zancudos, baratas, hormigas, pulgas, arañas, chinches, polillas y otros insectos plagas.

Doctor Fly puede ser empleado en tratamientos contra insectos molestos sobre cualquier tipo de superficies del hogar, industrias de alimentos y todo tipo de construcciones y sus alrededores.

Composición

Cipermetrina (CAS 52315-07-8).....20 g
Otros componentes c.s.p.100 g

Contenido

