

KILARVOL

Larvicida Emulsión Concentrada 2% 2 EC

Kilarvol® 2 EC es un regulador del crecimiento de los insectos (IGR) que permite que insectos como pulgas (*Pulex sp.*, *Ctenocephalides sp.*), baratas (*Blatella sp.*), garrapatas, chinches y otros insectos sean eliminados al no poder completar su ciclo de desarrollo.

Kilarvol® 2 EC posee un efecto insecticida sobre formas pre adultas de estos insectos-plaga, por lo que no posee efecto inmediato en el control de estados adultos.

Kilarvol® 2 EC tiene un mecanismo de control diferente a los insecticidas tradicionales, por lo que se complementa apropiadamente dentro de un plan de manejo integrado de plagas.

Kilarvol® 2 EC tiene efecto incluso sobre cepas de insectos resistentes a los insecticidas de uso común (piretroides, organofosforados y carbamatos).

Kilarvol® 2 EC debe ser mezclado con un insecticida adulticida para obtener un rápido control de insectos adultos, pudiendo emplearse como único método de control cuando el nivel de estos insectos-plaga sea baja.

Kilarvol® 2 EC posee una baja toxicidad para el hombre, animales domésticos y aves. Su DL₅₀ oral en ratas es superior a los 3.000 mg/Kg.

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (2) 749 8540
Fax: (2) 749 8541
www.bts.cl



Contenido: 1 Litro



INFLAMABLE



NOXIVO

“ENVASE DE USO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS”

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CUIDADO



Dosis:

Lugar a tratar	Plaga	Dosis de Kilarvol® 2 EC	Observaciones
Viviendas, casinos, restaurantes, bodegas, patios, agroindustrias, etc	Pulgas	Tratamiento Inicial: 25 a 40 cc/ 5 Lts. de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex, BTFly 25 ME o Butoflin en las dosis habituales de estos productos. Tratamiento Mantenición: 25 cc/ 5 Lts. de agua.	Aplicar mediante aspersión ligera con un cubrimiento de 100 m ² cada 5 litros de emulsión. Si la superficie es absorbente, puede aumentar la dosis hasta punto de goteo.
	Baratas, Garrapatas, Chinches, etc.	Tratamiento Inicial: 50 cc / 5 Lts. de agua, mezclado en el estanque de la bomba con un insecticida adulticida como Flynex, BTFly 25 ME o Butoflin en las dosis habituales de estos insecticidas. Tratamiento Mantenición: 25 cc/ 5 Lts. de agua.	

Para el control de pulgas, es recomendable realizar previamente un buen aseo de la vivienda o lugar a tratar. Se sugiere el uso de aspiradora en pisos y tapices.

Tiempo de Reingreso:

- 2 horas después de la aplicación. Luego de ésta, ventilar el recinto tratado. Si la aplicación es en el exterior, no hay tiempo de reingreso.

Precauciones:

- Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente la etiqueta y siga las instrucciones indicadas en la etiqueta y en la hoja de seguridad.
- Para su aplicación, emplee equipo de seguridad personal (guantes resistentes a químicos, máscara, overol y antiparras).
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Evitar la inhalación de humo y vapores.
- Se debe contar con equipos eficientes de extracción de gases en los lugares operativos con exposición.
- Las áreas de trabajo deben estar bien ventiladas. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no autorizadas y animales domésticos.
- No aplique este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina sin resguardo.
- No aplique este producto sobre alimentos, utensilios de cocina, jaulas o acuarios.
- Para la eliminación de los envases, someter a un proceso de triple lavado y perforar. Eliminar los envases vacíos en un centro de acopio o un incinerador aprobado para químicos.
- Almacenar este producto en su envase original cerrado. Almacenar en áreas bien ventiladas, secas y sin luz directa. **Envases dañados:** colocar los envases originales en otros más grandes, especialmente etiquetados. Nunca utilizar recipientes que ya han contenido el producto.

- Tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido de este envase a cursos o fuentes de agua.

Contiene Xileno como solvente, IRRITANTE.

Fórmula:

Cada 100 g, contienen:

Pyriproxyfen 2 g (CAS 95737-68-1)
Excipientes c.s.p 100 g

En caso de intoxicaciones llame al:
CITUC: (2) 635 3800
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (2) 749 8540

Kilarvol 2 EC 1 Lt.

Primeros auxilios:

- En caso de sospecha o contacto accidental con el producto, detener el trabajo inmediatamente y retirar al afectado de la zona de peligro. Realizar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica.
- Mantener abrigado y en reposo estricto.
- Si la respiración es defectuosa, hacer respiración artificial hasta la llegada de un médico.
- **Contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada. Lave totalmente con jabón y agua. Luego, enjuagar con agua limpia. Si la irritación persiste, avise a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Quite cualquier lente de contacto, e inmediatamente enjuague con agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste, avise a un médico inmediatamente.
- **Ingestión:** No induzca el vómito, ya que este producto posee solventes orgánicos. Beba agua y procure inmediatamente a un médico.

Antídoto y aviso al médico: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Este producto es Clase IV OMS. Cuidado, puede ser peligroso.

Registro ISP N°: P- 483/07

Serie:

Vencimiento:

