



50EC
MAXIFOR
Rápido, Duradero, Eficaz

Descripción del Producto

Maxifor 50 EC es un potente insecticida organofosforado, especialmente formulado para la realización de tratamientos preventivos y curativos en exteriores de bodegas, galpones, silos, casinos, instalaciones y viviendas en general.

Maxifor posee una alta efectividad sobre insectos voladores como moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, mosquitos, polillas, tábanos, avispa y otros insectos.

Además, su poderoso ingrediente activo, pirimifós metil, tiene una alta eficacia en el control de insectos rastreros, por lo que el uso de Maxifor 50 EC permite controlar gorgojos, pulgas, garrapatas, cucarachas, hormigas y ácaros. El uso de Maxifor 50 EC permite controlar también a los escolitos que dañan las maderas aserradas.

Maxifor 50 EC posee un muy rápido efecto de derribo/ volteo (Knock down) y un rápido efecto de mortalidad sobre los insectos. Una vez en contacto con la cutícula (exoesqueleto) de los insectos la atraviesa rápidamente, dirigiéndose a través de la hemolinfa y terminaciones nerviosas periféricas a los ganglios y tejidos nerviosos de todo el cuerpo. Una vez ahí, altera la acción de la acetilcolinoesterasa, provocando la muerte inmediata del insecto.

Maxifor 50 EC permite establecer programas de rotación que complementan a los insecticidas piretroides, neonicotínicos, carbamatos y otros, retrasando significativamente la generación de resistencia por parte de los insectos expuestos.

Instrucciones de Uso:

Lugar a Tratar	Plaga	Dosis	Observaciones
Exteriores de viviendas, parking, agroindustrias, bodegas, pabellones de crianza de animales, faenas mineras, etc.	Insectos voladores y rastreros	Aspersión: 50 a 100 ml/ 5 litros de agua. Emplee la dosis más baja para mantención y la más alta para tratamientos curativos. En caso de superficies muy absorbentes, puede aumentarse el agua hasta 10 litros.	Aplicar a punto de goteo. Use siempre equipo de protección personal
	Escolitos (Scolytus sp)	100 a 150 ml/ 5 litros de agua	
	Insectos voladores y rastreros	Termoniebla: 50 ml/ 1 litro de solvente	Use solventes orgánicos como parafina o petróleo. Puede usar agua como solvente si el equipo termonebulizador lo permite. Consulte el manual de uso del producto.

Forma de Aplicación

Maxifor 50 EC debe ser diluido en agua según la dosis recomendada. Calibre el gasto del equipo de aspersión de forma tal que asperje 20 m² de superficie a tratar con un litro de solución (aspersión).

Asperje a punto de goteo todas las superficies que desea tratar, evitando el escurrimiento. No aplique este producto contra el viento. Este producto es de uso en exteriores.

Principales Lugares de Aplicación

Moscas

- Todas las paredes y techos exteriores donde se posan las moscas.
- En planteles pecuarios, asperje con ese producto en cortinas, arbustos y malezas perimetrales de los galpones.
- Aplique Maxifor 50 EC en todos aquellos lugares donde se posan las moscas (paredes soleadas, cabezales de galpones, etc).
- Posee un efecto de volteo inmediato.

Baratas

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros (Exteriores).
- En grietas, hoyos y rendijas de paredes.
- Tubos de desagüe (aplicar de arriba hacia abajo).

Garrapatas

- Patios y paredes de la vivienda, casa del perro y lugares en donde transita.



Pulgas

- Asperjar el piso de la vivienda (exterior). Una vez aplicado, no riegue por al menos 24 horas. Puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7 días.

Gorgojos y Polillas

- Limpiar las bodegas e instalaciones anexas, eliminando desechos y restos de granos y harinas.
- Aplicación sobre superficie de sacos que contengan granos o harina.
- Asperjar a nivel de pisos y paredes (exteriores).

Ácaros

- Aseo profundo de ambientes, evitando acumulación de polvo y exceso de humedad. Asperjar a nivel de pisos y paredes (exteriores).

Precauciones

Durante la manipulación, preparación de la solución y la aplicación, utilizar traje apropiado, guantes y botas de goma, anteojos y máscaras protectoras con filtros adecuados.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

La aplicación no debe ser contra el viento. No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada una hora después de aplicado el producto previo a una ventilación de 2 horas. Esta medida es sólo por algún rastro de olor del producto, sin embargo, no es necesario por motivos toxicológicos.

Síntomas de intoxicación: Salivación excesiva, depresión, respiración rápida y difícil.

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental **NO PROVOQUE VOMITOS**. Administre carbón activado y envíe inmediatamente a un médico, llevando un envase o etiqueta del producto.

Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si persiste la irritación acuda a un médico.

Piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación llame inmediatamente a un médico.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.

Antídoto: Usar Atropina Endovenosa o Intramuscular: 2-4 mg/ Kg. cada 15 minutos. No dar atropina a pacientes cianóticos. En casos severos, complementar con Obidoxima EV: 250 mg (máximo 750 mg/ día).

NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 100 ml de producto contienen:

Pirimifós Metil.....50 g

Cas N° 29232-93-7

Excipientes c.s.p.....100 g

Registro ISP N°: P-480/07

Fabricado por Intrade S.A. Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago.

Fono (56-2) 7498540, fax (56-2) 7498541.

Mayores Consultas en: www.bts.cl o consultando el Manual de Uso de este producto.

