

Fabricado por:  
Dankong Industry &  
Trade Group Co. Ltd.  
83 Jiefang North road,  
Jiaojiang 318000,  
Zhejiang, China.

Importado y  
distribuido por:  
**BTS-Intrade**  
**Laboratorios S.A.**  
Mar del Sur 7358,  
Pudahuel,  
Santiago de Chile.  
Fono: (2) 749 8540  
Fax: (2) 749 85 41  
[www.bts.cl](http://www.bts.cl)

Envasado por  
**Intrade S.A.**  
Mar del Sur 7358,  
Pudahuel

## INDICACIONES

**Dosis general:** 1 g. de **STOPFLY** por metro cuadrado de superficie de materia orgánica a tratar.

## METODO DE APLICACION:

Disolver una medida (20 g) de **STOPFLY** en 5 litros de agua. Aplicar en dosis de 250 cc. de solución por metro cuadrado de superficie; 5 litros de solución se deben aplicar sobre 20 metros cuadrados. Es muy importante respetar la dosificación y cubrimiento.

La aplicación debe ser realizada con un tamaño de gota gruesa (300 a 400 micras) mediante una máquina pulverizadora de espalda o bien una regadera.

El tratamiento debe ser complementado con insecticidas adulticidas tradicionales para el control de moscas adultas.

El tratamiento con **STOPFLY** debe ser repetido según las condiciones cada 20 a 45 días.



**STOPFLY** es un insecticida regulador del crecimiento de larvas de moscas. Actúan impidiendo que éstas puedan completar su ciclo y emerger de la pupa.

**STOPFLY** es altamente recomendable para la implementación de un programa integral del control de moscas.

**STOPFLY** funciona incluso ante larvas de moscas resistentes a otros insecticidas tradicionales.

**STOPFLY** no tiene efectos sobre las moscas adultas, por lo que se debe emplear sólo en el tratamiento de las moscas preadultas de este insecto (larvas).

**STOPFLY** actúa sobre larvas de otros dípteros de importancia en Salud Pública como los zancudos.

**STOPFLY** a diferencia de los insecticidas tradicionales, tiene como ingrediente activo un compuesto que afecta sólo a los insectos, por lo que posee una baja toxicidad para el hombre y animales domésticos.

**STOPFLY** está indicado para ser usado en salas de basura, basurales, fecas de animales domésticos, mataderos y otros lugares en donde se acumula materia orgánica susceptible de ser fuente de generación de moscas.



*Su socio en terreno*

## PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Si la víctima está totalmente consciente dar enseguida 1 o 2 vasos de agua tibia a beber e inducir el vómito. Nunca dar nada a una persona que se encuentre inconsciente. Llevar a un centro asistencial.
- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente. No aplicar ningún medicamento, excepto el indicado por el médico.
- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo la piel que se encuentra bajo las uñas. Sacar la ropa contaminada y lavar la piel.
- **Inhalación:** Sacar a la persona desde el área contaminada al aire fresco. Si es necesario, aplique respiración artificial.

## OBSERVACIONES

**STOPFLY** es un IGR (regulador del crecimiento de insectos) derivado del grupo de las triazinas.

**STOPFLY** posee un muy baja toxicidad, sin embargo, se deben observar las siguientes medidas de precaución:

- Evitar inhalar durante la aplicación y la dilución del producto.
- No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.
- Usar siempre ropa y equipo de protección adecuado: overall, máscara de protección respiratoria, anteojos, botas y guantes de goma.
- No aplicar en recintos en donde se acumulan alimentos.
- Almacenar el producto bajo llave y fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto a alimentos de consumo humano o animal.
- Antes de aplicar, lea cuidadosamente toda la etiqueta y destruya el envase una vez vacío.

## ANTIDOTO

No hay antídoto específico.  
Aplicar tratamiento sintomático.

## COMPOSICION

Cada 100 g de producto contiene:  
Ciomazina sulfato..... 50 g  
Excipientes c.s.p. ....100 g

Registro ISP N° P-360/08

Contenido:

**500 g.**

Lote:

Vence:



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
**CUIDADO**

