

# DEADLINE®

## RATICIDA ANTICOAGULANTE

**Descripción:** Raticida anticoagulante para control de roedores en actividades urbanas agrícolas y forestales.

**Composición:** Cada 100 g de producto contiene:  
 3-[3-(4'-bromodifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-H-1-benzopiren-2-ona (Bromadiolona) ..... 0.005 g. N° CAS 28772-56-7  
 Exc csp ..... 100 g.

Autorización SAG N°: 1686 Cebo (RB)

Lote:

Vanco:



Distribuido por:  
 BTS-Intrade Laboratorios S.A.  
 Mar del Sur 7358, Pudahuel,  
 Santiago  
 Fabricado por: Intrade S.A.  
 Mar del Sur 7358, Pudahuel,  
 Santiago.

**Producto no inflamable no corrosivo no explosivo  
 LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Precauciones:**  
 Este raticida pertenece a los anticoagulantes derivados de la 4 hidroxi cumarina.  
 Debe ser empleado sólo por personas adultas y empleando guantes de goma impermeables y ropa adecuada para evitar el contacto con la piel.

**Primeros auxilios:**  
 Los síntomas de intoxicación aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.  
 Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado, el cual se manifiesta con Petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre. En caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, éstos deben ser lavados con agua tibia por al menos 10 minutos. En caso de ingestión accidental, se debe inducir al vómito y procurar atención médica de inmediato. En caso de inhalación de este producto, se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.

**Tratamiento médico:** concorra a un centro de urgencia mostrando la etiqueta de este producto.

**Antídoto:** vitamina K

**Toxicidad:** este producto es moderadamente tóxico para el hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingestión. Tóxico para peces. No elimine residuos en cursos de agua.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.  
 EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.  
 LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.  
 NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
 NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**Teléfonos de emergencia:**  
 Convenio CITUC 2 - 6353800  
 Intrade S.A. 2 - 7498540



**CUIDADO**

Contenido neto:  PELLETS (Reg. ISP P-267/11)  
 CEBO RATICIDA (Reg. ISP P-269/11)  
**5 kg**



### Descripción:

**Deadline** actúa impidiendo la normal coagulación de los roedores, los que mueren luego de 3 a 7 días de consumirlo. Este raticida funciona con dosis única, por lo que basta una sola ingesta para que el roedor muera.

### Instrucciones de Uso:

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	25 g cada 3 a 5 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	25 a 50 g cada 5 a 10 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	25 a 50 g cada 5 a 10 metros

En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del nivel de infestación presente.

Instalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores.  
 Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

**Deadline** no requiere preparación, viene listo para su uso.

No es fitotóxico y no tiene periodos de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

**Tiempo de reingreso:** Debido a la naturaleza del producto y su formulación no existe un tiempo mínimo de reingreso.

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ÉSTE.

Contenido neto:

**5 kg**

- PELLETS (Reg. ISP P-267/11)  
 CEBO RATICIDA (Reg. ISP P-269/11)

Lote:

Vanco:



**CUIDADO**

