

RODEX BLOQUES PARAFINADOS

RATICIDA ANTICOAGULANTE 2º GENERACIÓN

Cebo en Bloque (BB)

Descripción: Raticida anticoagulante para control de roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) y lagomorfos (*Oryctolagus cuniculus*, *Lepus capensis*) en actividades agrícolas y forestales.

Composición: Cada 100 g de producto contiene:

Brodifacoum*	0.006 g	N°CAS 56-073-10-0
*3-[3-(4-bromodifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiren-2-ona		
Benzozato de denatonio (amargante preventivo ingesta humana)	0.001 g	
Colormulantes, csp	100.0 g	

Autorización SAG Nº: 1687
Reg. ISP P-330/07

Lote:
Venec:



Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7356, Pudahuel,
Santiago.
Distribuido por:
BTS-Intrade Laboratorios
Mar del Sur 7356, Pudahuel,
Santiago

Producto no inflamable no corrosivo no explosivo
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Precauciones y advertencias

Debe ser empleado sólo por personas adultas y utilizando overol y guantes de goma impermeables para evitar el contacto con la piel. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Grupo químico: Brodifacoum, ingrediente activo de RODEX BLOQUES PARAFINADOS, pertenece al grupo químico de la 4-Hidroxicoumarina.

Síntomas de intoxicación: aparecen luego de unos días del ingreso de este producto al organismo.

Su principal síntoma es la aparición de un tiempo de coagulación retardado el cual se manifiesta con petequias en mucosas como encías y ojos, aparición de hematomas en el cuerpo y micción con sangre.

Primeros auxilios: en caso de tomar contacto con este producto a través de la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. De presentarse algún tipo de molestia, recurrir a un médico.

En caso de contacto con los ojos, éstos deben ser lavados con agua tibia por al menos 10 minutos. De persistir molestia, recurrir a un médico.

En caso de ingestión accidental, se debe inducir al vómito y procurar atención médica de inmediato.

Por la naturaleza de la formulación de este producto no es probable la intoxicación por inhalación, sin embargo de ocurrir, se debe trasladar al afectado al aire libre y procurar atención médica de urgencia.

Tratamiento médico de emergencia: concurre a un centro de urgencia mostrando la etiqueta de éste producto.

Antídoto: vitamina K en dosis de 20 a 40 mg/kg de peso.

Toxicidad: este producto es moderadamente tóxico para el hombre, aves y otros mamíferos de gran tamaño. Este producto contiene un amargante que impide su ingestá. Tóxico para peces. No elimine residuos en cursos de agua.

MANUTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
ESTE PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR EXCLUSIVO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LOS ENVASES DEBEN SER DESTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Teléfonos de emergencia:
Convenio CITUC 2 - 635 3800
Intrade S.A. 2 - 749 8540



Contenido neto:
5 kg

- BLOQUES PARAFINADOS
 MINIBLOQUES PARAFINADOS



CUIDADO

Rodex Bloques Parafinados

Descripción:

RODEX[®] actúa impidiendo la normal coagulación de los roedores (*Mus musculus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) y lagomorfos (*Oryctolagus cuniculus*, *Lepus capensis*), los que mueren luego de 3 a 7 días de consumirlo. Este raticida funciona con dosis única, por lo que basta una sola ingesta para que el roedor o lagomorfo muera.

Instrucciones de Uso:

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	5 a 10 g cada 3 a 5 metros
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	10 a 20 g cada 5 a 10 metros
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	10 a 20 g cada 5 a 10 metros
Conejo / liebre	<i>Oryctolagus cuniculus</i> / <i>Lepus capensis</i>	2 a 4 kg por hectárea

Se recomienda el uso de la dosis menor o mayor, de acuerdo al grado de infestación presente.

En caso de tratamientos en áreas abiertas se recomienda una dosis de 3 a 5 kilos por hectárea, dependiendo del grado de infestación presente.

Instalar los cebos en lugares demarcados y en los lugares de tránsito de los roedores o lagomorfos. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

RODEX[®] no requiere preparación, viene listo para su uso.

No es fitotóxico y no tiene periodos de reingreso para personas, evite el ingreso de animales domésticos al área de tratamiento mientras éste se está efectuando.

Tiempo de reingreso: debido a la naturaleza del producto y su formulación, no existe un tiempo de reingreso al área tratada tanto de personas como de animales.

DEBIDO A LA NATURALEZA DE ESTE PRODUCTO Y LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE AFECTAN EL RESULTADO FINAL DEL TRATAMIENTO, EL FABRICANTE NO GARANTIZA EL ÉXITO DE ESTE.

Contenido neto:
5 kg

Autorización SAG Nº: 1687
Reg. ISP P-330/07

- BLOQUES PARAFINADOS
 MINIBLOQUES PARAFINADOS



CUIDADO