

DEADLINE®

CEBO MOLIENDA

LISTO PARA USAR

Deadline Cebo Molienda

Fórmula:

Cada 100g contiene:
 Bromadiolona0.005g CAS N° 28772-56-7
 Benzoato de denatonio0.001g
 Excipientes c.s.p. 100g

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Serie:

Vence:



Fabricado por: Intrade S.A.
 Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
 Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
 BTS Intrade Laboratorios S.A.
 Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
 Pudahuel, Santiago de Chile.
 Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Deadline Cebo Molienda es un potente raticida de acción anticoagulante de segunda generación, formulado para un eficiente control de toda clase de roedores, incluso aquellos resistentes a otro tipo de raticidas.

Deadline Cebo Molienda necesita sólo una dosis para producir la muerte del roedor por hemorragias internas a los 4 - 7 días de su ingestión.

Precauciones:

No almacenar junto con alimentos. No fume, beba o coma durante la aplicación. Utilice guantes para manipular el producto. Evite el contacto con la piel o los alimentos. Conservar el producto en su envase de origen, bien cerrado y en un lugar seguro. Una vez realizada la aplicación, lávese las manos con abundante agua y jabón. Elimine en forma segura el envase una vez vacío.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido neto:

5 Kg

sachets de 25 g aproximadamente.

En caso de intoxicaciones llame a:
 CITUC: (56) 2 2635 3800
 (Atención las 24 horas los 365 días del año).
 BTS Intrade Laboratorios S.A.
 (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).



CUIDADO



Modo de uso:

Viene listo para usar en sachets. Distribuya los cebos en lugares frecuentados por roedores y que no sean accesibles a los niños y animales domésticos. Reponga cada una semana hasta que cese el consumo de **Deadline Cebo Molienda**.

Especie plaga		Dosis
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	1 sachet cada 3 a 5 m.
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i>	1 a 2 sachets cada 5 a 10 m.
Rata de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	1 a 2 sachets cada 5 a 10 m.

Instalar los cebos en los lugares de tránsito y albergue de los roedores en tubos o cajas cebadoras. Reponer continuamente cada 7 días hasta que cese el consumo.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones. Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito. Acudir al centro asistencial más cercano llevando el envase u hoja de seguridad del producto. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.

Condición de venta: General.

Clasificación Toxicológica: IV, Poco Probable Peligro en su Uso Normal.

Registro ISP N° P-269/21

Contenido neto:

5 Kg

sachets de 25 g aproximadamente.

Serie:

Vence:



CUIDADO

