



**VENENO**

**MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Fórmula:

Cada 100 g contiene:  
Brodifacoum ..... 0.005 g  
N° CAS 56073-10-0

Benzoato de Denatonio ..... 0.001 g  
Excipientes atractivos c.s.p. .... 100 g

Grupo Químico: Derivado Cumarínico.

Contenido Aproximado: 500 g.  
(bloques parafinados de  
aproximadamente 20 g c/u)

Registro ISP N° P-330/17

Condición de Venta:  
GENERAL

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
CUIDADO**

**RodeX**

BLOQUE LISTO PARA USAR

CONTENIDO APROX.

**500 g**


Bloques Parafinados de 20g Aprox.



**R A T I C I D A**

**RodeX**

**BLOQUE  
LISTO PARA USAR**



**Mínima Dosis  
para un Máximo  
Control**



**VENENO**

**MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Fórmula:

Cada 100 g contiene:  
Brodifacoum ..... 0.005 g  
N° CAS 56073-10-0

Benzoato de Denatonio ..... 0.001 g  
Excipientes atractivos c.s.p. .... 100 g

Grupo Químico: Derivado Cumarínico.

Contenido Aproximado: 500 g.  
(bloques parafinados de  
aproximadamente 20 g c/u)

Registro ISP N° P-330/17

Condición de Venta:  
GENERAL

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
CUIDADO**

**RodeX**

BLOQUE LISTO PARA USAR

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guareñ o Rata de Alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	1 a 2 bloques / 5 a 10 metros lineales
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 bloque / 3 a 5 metros lineales

Modo de uso:

RodeX bloques parafinados es un eficaz  
rodenticida anticoagulante de última  
generación, que mata ratas y ratones.

Su uso está especialmente indicado para  
exteriores, donde existen condiciones de  
humedad y variaciones de temperatura.  
Necesita sólo una dosis para producir la  
muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su  
ingestión.

Puede ser aplicado en cualquier época del  
año. Coloque 1 a 2 RodeX bloques  
parafinados cada 5 a 10 metros para ratas  
y guarenes y cada 3 a 5 metros para ratones  
o lauchas, dependiendo de la infestación  
en los lugares más frecuentados por los  
roedores (bodegas, desagües, entretechos,  
alcantarillas, botaderos). Puede ser  
aplicado en lugares de alta humedad.  
Repetir la dosis hasta notar que ha cesado  
el consumo.

Precauciones:

Conserve RodeX bloques parafinados en  
su envase original, en un lugar fresco y  
seco.  
Manténgase fuera del alcance de los niños,  
de personas no responsables y de los  
animales domésticos.  
Evite el contacto con la piel.  
Usar guantes para su aplicación y lavarse  
las manos con agua y jabón después de  
ésta.  
No comer, beber ni fumar durante su  
aplicación.  
Asegúrese de aplicar el producto en  
lugares no accesibles a niños y animales  
domésticos y lejos de alimentos, bebidas y  
de lugares de preparación de los mismos.  
Eliminar los bloques no consumidos y  
destruya los envases vacíos.  
No almacene junto con alimentos.

Síntomas de Intoxicación

Puede producir hemorragias variables  
según la ingesta y retardo del tiempo de  
coagulación.  
Se puede observar petequias y equimosis  
(sangramiento, hemorragias, etc.), letargo,  
temblores musculares, dolores  
abdominales y en casos extremos pueden  
ocurrir convulsiones.  
Puede causar irritación ocular moderada.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión accidental, no induzca  
el vómito. Acudir al centro asistencial más  
cercano llevando el envase u hoja de  
seguridad del producto.  
En caso de contacto con la piel, lave con  
agua y jabón.  
En caso de contacto con los ojos, retire  
lentes de contacto y lave los ojos con agua  
tibia por unos minutos, si la molestia  
persiste, consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 2635 3800  
(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Fabricado por: Intrade S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl