

F i c h a T é c n i c a



Descripción del producto

StopFly® 50 WP es un larvicida específico contra moscas, que se aplica directamente sobre el sustrato productor de larvas, como guano, purines y micro/macro basurales.

StopFly® 50 WP funciona inhibiendo el desarrollo y crecimiento de las fases larvianas de mosca doméstica y pequeña mosca doméstica.

StopFly® 50 WP está formulado en base a Ciromazina, un ingrediente activo de alta efectividad en el control de larvas de moscas presentes en las zonas de fuentes de cría. **StopFly® 50 WP** evita el paso de larva III a pupa, reduciendo en forma importante la emergencia de moscas adultas, situación que es evidente luego de 10 a 14 días de aplicación del producto.

StopFly® 50 WP está indicado para Programas de Control Integrado de Moscas, siendo un efectivo complemento a los tratamientos adulticidas hechos con Flynex® 20 EC, Doctor Fly®, BTFly® 2,5 ME, Agita® 10 WG y otros insecticidas.

La refinada formulación de **StopFly® 50 WP** permite óptimos niveles de control sin alterar las condiciones del guano ni tener efectos sobre la fauna benéfica (coleópteros depredadores de huevos de moscas) presente en él, manteniendo una actividad larvicida por prolongados períodos de tiempo.

Instrucciones de Uso:

StopFly® 50 WP se emplea mediante aspersion directa sobre el guano o sustrato a tratar, procurando un adecuado mojamiento de toda la superficie de este.

Plaga	Dosis
Larvas de moscas	Diluir 60 g de StopFly® 50 WP en 15 litros de agua y asperje en 60 m ² de guano, purines y/o micro/macro basurales.

Uso en lecherías:

- Terneras: asperjar en los contornos interiores o una franja de 50 cm. de ancho por todo el perímetro de corrales colectivos e individuales. Repetir a los 20 a 30 días de la aplicación.
- Acúmulo de fecas, cama de terneros, restos de ensilaje y orujo de cereales: Asperjar meticulosamente sobre la superficie. Repetir a los 20 a 30 días.
- Contornos de comederos y bebederos: Asperjar meticulosamente en los contornos de comederos y bebederos, en una superficie de 50 cm. en todo el contorno. Repetir a los 20 ó 30 días.
- Purineras: Asperjar sobre la capa semisólida de la purinera. Repetir a los 20 días.

Uso en criaderos de Cerdos:

- Acúmulo de guano prensado: Asperjar meticulosamente sobre el acúmulo cada 20 a 30 días.

Uso en Gallineros (postura en jaula):

- Guaneras: aplicar directamente sobre el guano cuando este tenga 5 cms. de altura. Repetir a los 20 a 40 días después, dependiendo de la densidad de aves presente.

Precauciones

Durante la manipulación del producto se debe utilizar traje apropiado, guantes, máscara y botas de goma.

Mantenga el producto alejado de niños y animales domésticos.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento: Mantenga el producto apartado de animales y alimentos para animales. El producto debe estar en su envase original, etiquetado, sellado y en un lugar fresco, seco y ventilado.

Síntomas de intoxicación y Primeros auxilios: No se conocen síntomas de intoxicación por inhalación.

En caso de contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito.

StopFly® 50 WP no tiene antídoto específico, sólo tratamiento sintomático.

Una vez aplicado el producto, lávese las manos con agua y jabón en forma abundante.

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cada 1000 g de producto contienen:

Ciromazina500 g

Registro ISP N° : P-360/18

Fabricado por Dankong; Binhai Road 259, Yantou Jiojang, Taizhou, China.
Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A., Mar del Sur 7358, Barrio Industrial, Pudahuel, Santiago de Chile. Fono (56) 2 2749 8540.

Mayores Consultas en: www.bts.cl

